












SI CURSÁS UN EMBARAZO Y TENÉS CHAGAS, ES IMPORTANTE QUE SEPAS:

-  El Chagas no afecta el normal desarrollo del embarazo, ni causa malformaciones.
-  No se transmite por la lactancia materna ni por relaciones sexuales.
-  Aunque tu bebé no presente síntomas al nacer o los primeros meses, puede tener Chagas y hay que hacerle controles médicos hasta el año de vida.
-  La transmisión perinatal puede ocurrir en más de un embarazo. Por eso, si tenés otros/as hijos/as, ellos/as también deben realizarse un análisis de diagnóstico de Chagas para poder acceder oportunamente al tratamiento.
-  Es necesario que te hagas un control médico una vez al año para detectar en forma temprana posibles manifestaciones clínicas de la infección.

Programa Provincial de Chagas - Dirección de Epidemiología -
Ministerio de Salud de Córdoba

-  Santiago Cáceres 1885 - B° Cáceres, ciudad de Córdoba – Argentina
-  0351 434 4112
-  0351 157 04 6555 (notificación por presencia de vinchucas)
-  0351 157 66 2354 (consultas generales)
-  programachagascba@gmail.com
-  Programa Chagas Córdoba

Ministerio de
SALUD



Hacemos

CHAGAS PERINATAL

EL CONTROL COMIENZA DESDE EL EMBARAZO



¿QUÉ ES EL CHAGAS?

Es una infección causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*, que puede afectar el corazón, el sistema digestivo u otros órganos de las personas.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Es un simple análisis de sangre, que se realiza de manera gratuita en centros de salud y hospitales públicos.



El análisis de detección de Chagas es un derecho de todas las personas gestantes y es obligación del equipo de salud ofrecerlo.

Leyes 26.281 y 26.279.

¿QUÉ ES LA TRANSMISIÓN PERINATAL?

Es la forma de transmisión que ocurre cuando el parásito pasa de una persona gestante con infección por Chagas a su bebé, durante el embarazo.



¿QUÉ CONTROLES HAY QUE HACERLE AL BEBÉ CUANDO NAZCA?

Si ya sabés que tenés Chagas o si te detectan la infección en el embarazo, a tu bebé se le realizarán al menos tres controles:

Al nacer. Se le tomará una muestra de sangre para detectar si hay presencia de parásitos. De ser así, la infección se confirma y recibe el tratamiento antiparasitario.

Al mes. Si en la primera muestra no se confirmó el diagnóstico, es necesario realizar un nuevo control entre el mes y los tres meses de vida. Si la infección se confirma, recibirá el tratamiento antiparasitario.

A los 10 meses. Si no se encontraron parásitos en ninguna de las muestras anteriores, se hará un nuevo análisis de sangre para detectar anticuerpos. Si la infección se confirma, recibirá el tratamiento antiparasitario.

Si los tres estudios resultan negativos, se descarta la infección por Chagas.



¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO?

Es altamente efectivo en niños, niñas y adolescentes menores de 19 años. Mientras antes se administre, más posibilidades de éxito tendrá.

Se toma por vía oral durante dos meses, y debe administrarse bajo supervisión médica.

Las personas gestantes también pueden acceder al tratamiento después del parto y de la lactancia para disminuir las posibilidades de transmisión perinatal en los próximos embarazos.

Es gratuito.

